

איתור מוקדם

סימנים מוקדמים העלולים להצביע על חשד
להתפתחות אוטיזם בשנת החיים הראשונה



גדילה מואצת של היקף הראש
ביחס למידת ההיקף לאחר הלידה

הימנעות מקשר עין ישיר
חוסר קשר עין עם אנשים,
קיים קשר עין עם חפצים

חוסר רצון או התנגדות לאכול
יניקה או אכילה מבקבוק,
קושי במעבר לאוכל מוצק

חוסר תגובה לקול או לנוכחות הורה
אין הפניית ראש להורה חוסר חיוך,
חוסר מלמול

רתיעה ממגע של הורה
רגישות יתר חושית,
הקשתת הגוף לאחר
או התכווצות הגוף

פסיביות יתר
חוסר בכי
חוסר תנועה
חוסר עניין בסביבה

התפתחות מוטורית מאוחרת
היפוטוניה (טונוס שרירים נמוך),
זחילה מאוחרת, הליכה מאוחרת

אקטיביות יתר
בכי מתמיד ללא
סיבה רפואית,
חוסר שקט פיזי

* כל אחד מהסימנים המופיעים לעיל יכול לאפיין גם בעיות התפתחותיות אחרות אשר אינן קשורות באוטיזם. לכן יש לערוך בדיקות רפואיות. אם מתגלים לפחות שני סימנים לאורך זמן, ולאחר שנשללו בעיות רפואיות, יש לבדוק אפשרות של הפרעה התפתחותית בספקטרום האוטיזם.